

	<p style="text-align: center;">Casa di cura “VILLA SERENA” S.p.A. CENTRO DI RIABILITAZIONE CARDIOCIRCOLATORIA, RESPIRATORIA, NEUROMOTORIA E LUNGODEGENZA Direttore Sanitario f.f. : Dott. Gianmauro MAZZUCCO 10045 PIOSSASCO, Via Magenta 45 <i>Telefono : 011/90.39.888(centralino) – 011/90.39.622 (prenotazioni)</i> <i>Fax : 011/904.22.11 E-mail: posta@villaserenapiossasco.it</i> <i>Sito Internet: http://www.villaserenapiossasco.it</i></p>	<p style="text-align: center;">IP06</p> <p style="text-align: center;">Rev. 2</p> <p style="text-align: center;">18/08/2022</p>
---	---	--

Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche
Responsabile: dott.sa Ivana Ricatto

ISTRUZIONE PREANALITICA PER L'ESECUZIONE DELLE CURVE DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO

MODALITA' DI ACCESSO

Il/la paziente deve presentarsi per il prelievo a digiuno entro le ore 08:00 del mattino.

La modalità di esecuzione dell'esame è in accesso libero.

Una corsia preferenziale lo/la condurrà direttamente all'accettazione e alla sala prelievi per l'esecuzione della glicemia basale. Il/la paziente, eseguito il prelievo, dovrà aspettare il risultato della glicemia e solo se inferiore ad un certo limite soglia, verrà richiamato/a per eseguire la curva il giorno successivo.

○ OGTT 2 (2 punti)

Il carico orale di glucosio preparato dal personale deve essere bevuto nell'arco di 5 minuti insieme a circa 300 mL d'acqua.

Dopo 2 ore si esegue il secondo prelievo.

Durante tutta la durata del test il/la paziente deve stare seduto/a, non mangiare e non fumare.

○ OGTT 3 (3 punti)

Il carico orale di glucosio preparato dal personale deve essere bevuto nell'arco di 5 minuti insieme a circa 400 mL d'acqua.

I prelievi successivi vengono eseguiti dopo 1 ora e 2 ore dal carico.

Durante tutta la durata del test il/la paziente deve stare seduto/a, non mangiare e non fumare.

○ OGTT6 (6 punti)

Verrà somministrato un carico orale di glucosio preparato dal personale che deve essere bevuto nell'arco di 5 minuti insieme a circa 200 mL d'acqua. Successivamente saranno eseguiti 6 prelievi a 30', 60', 90', 120', 150' e 180'.

Durante tutta la durata del test il/la paziente deve stare seduto/a, non mangiare e non fumare.